“Цинкалекс А”

порошок у саше-пакетиках

Склад: цинку сульфат – 44 mg (мг) або цинку глюконат – 75,2 mg (мг); (у перерахунку на іон цинку – 10 mg (мг), ретинолу ацетат – 0,4 mg (мг); допоміжні речовини: мальтодекстрин, сахароза.

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування - **джерело цинку та вітаміну А;** сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту (у тому числі при діареях різного походження) та покращенню апетиту, запобігає виникненню алергічних реакцій та дерматологічних проблем.

Цинкалекс А корисно вживати під час інтенсивного росту дитини, особливо в пред- і пубертатному віці.

Цинк є одним із найважливіших мікроелементів, який входить до складу багатьох ферментних систем, що регулюють основні процеси обміну речовин та гормонів. Застосування **цинку** та **вітаміну А** в будь-якому віці забезпечує нормальний стан шкіри, волосся, нігтів, сприяє покращенню роботи ендокринної, нервової та імунної системи. **Цинк** покращує репродуктивну функцію (впливає на сперматогенез), розумову діяльність, здатність до навчання та пам’ять.

У зв’язку з тим, що депо **цинку** в організмі немає, недостатнє вживання **цинку** сприяє порушенню клітинного та гуморального імунітету. Саме тому **застосування продукту Цинкалекс А буде корисним під час сезонних застудних захворювань,** інфекціях верхніх та нижніх дихальних шляхів **для підвищення опору організму та зменшення частоти респіраторних інфекцій у дітей та дорослих.**

Дефіцит **цинку** може виникати при діареях та проявлятися зниженням апетиту. За даними низки рандомізованих клінічних досліджень встановлено, що призначення **цинку** в дозі 5-20 мг на добу протягом 10-14 днів (під час діареї та декілька днів після перенесеного гострого гастроентериту) не лише зменшує тривалість і тяжкість діареї, але й запобігає виникненню подальших випадків гастроентеритів протягом принаймні 2-3 міс. Таким чином, застосування **Цинкалекс А** буде корисним для дорослих та дітей з 3-х років при порушенні харчування (вибірковий апетит), всмоктування та перетравлення в шлунково-кишковому тракті, глистяних інвазіях, у тому числі ентеробіозі, та діареях різного походження, а регулярне застосування буде сприяти підвищенню апетиту та покращенню функціонування шлунково-кишкового тракту.

Нестача **цинку та інших вітамінів, у тому числі вітаміну А** спричиняє погане загоєння ран, дерматологічні порушення (алопецію, акне). **Цинк** впливає на збереження нормального рівня **вітаміну А** в крові. Застосування **Цинкалекс А** при ентеропатичному акродерматиті, запальних станах шкіри та алергічних реакціях може сприяти скорішому відновленню шкіри.

Цинкалекс А не має у складі барвників та консервантів, тому може застосовуватися в осіб зі схильністю до алергічних реакцій.

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Харчова (поживна) цінність 100 г добавок:
білки – 0 g (г); жири – 0 g (г); вуглеводи – 97,0 g (г)

Енергетична цінність (калорійність) 100 г добавок: 388 kcal (ккал).

Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової дози: білки – 0 g (г);
жири – 0 g (г); вуглеводи – 5,82 g (г)

Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої добової дози: 23,28 kcal (ккал).

Рекомендовано вживати: по 1 саше-пакетику порошку 1 раз на день під час вживання їжі дітям віком від 3-х до 7 років. Дітям старшим 7 років та дорослим по 2 саше-пакетики порошку 1 раз на день протягом 1-2 тижнів. Термін та дози вживання може бути змінено за призначенням лікаря.
Не перевищувати рекомендовані добові дози.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання:
індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту, діти до 3-х років.

Умови зберігання та термін придатності: зберігати в упаковці виробника, в сухому приміщенні за температури від 1 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 75 %, строк придатності – 3 роки з дати виготовлення. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Пакування: порошок по 3 г в саше-пакетиках, по 8 саше-пакетиків у картонних коробках.

Кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва та строк придатності, номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Не є лікарським засобом

Виробник: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС» на замовлення ПП «МСК-МЕД», Україна, 04060, м. Київ, вул. Подвойського, 11-А, кв. 11.

Адреса виробничих потужностей: смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська 360.

ТУ У 10.8-38321787-001:2016